



Principio Activo

Lenalidomida

Marca

REVLIMID Cps 2,5, 5, 7,5, 10,15,20, 25 mg

Clase

Antiangiogénico Inmunomodulador inmunosupresor

Indicación

Linfoma de céls del manto, MM, Sde mielodisplásico

Dosis

Sde mielodisplásico: 10 mg/d y MM y linfomas: 25 mg/d

Dosis Renal

****En MM y linfomas:** FGe 30-50: 10 mg/d (si tras 2 ciclos no responde y lo tolera bien puede aumentarse a 15 mg/d). FGe 10-29: 15/48 h ó 7,5 mg/d FGe

Nefrotoxicidad

FRA (padecer amiloidosis, edad avanzada, ERC subyacente y proteinuria en rango nefrótico que condicione hipoalbuminemia son factores de riesgo de FRA), presente en 66%, grave en 32%, precisaron HD 10%. Media de tiempo desde el inicio del ttº hasta FRA: 44 días. **SLT, NTA, NIIA y sde. de DRESS** (entre 2-6 s tras el inicio del ttº), Fanconi, casos de pantubulopatía. **GNCM, hipopotasemia (6,2%). Raramente hipocalcemia.** **Vida media 3 horas con FG conservado, en Iª renal se prolonga a 6-12 horas, Unión a proteínas plasmáticas: 35-45%** **Eliminación renal (90%) tanto por FG como por secreción tubular activa. Entra al TP por endocitosis y puede acumularse.**

Plan