

## Principio Activo

Vincristina

## Marca

VINCRISTINA Vail 1,2 mg

## Clase

Antimitóticos Alcaloides de Vinca

## Indicación

Mama, ovario, pulmón microcítico, retina, LLA, LH, linfoma no folicular, LNH, meduloblastoma, melanoma, micosis fungoide, MM, neuroblastoma, osteosarcoma, púrpura trombótica isiopática,, sarcoma de Ewing, tumor de Wilms

## Dosis

1,4 mg/m<sup>2</sup>

## Dosis Renal

No es preciso ajustar dosis

## Nefrotoxicidad

**Hiponatremia por SIADH**: efecto toxico directo sobre HT y neuroHPF: depósito de esferoides axonales en el ansa lenticularis , área rodeada por sustancia innominata, amigdala y núcleo supraóptico lo que interfiere con el efecto inhibidor del núcleo supraóptico.

Ocurre 1-2 semanas tras la administración. Incidencia: en diversas series entre 5,9 y 11,2%

Clínica preliminar: Ileo paralítico y parestesias.

Factor Riesgo: Ttº concomitante con azoles (voriconazol, itraconazol, posaconazol, ketoconazol) que pueden inhibir su metabolismo y aumentar su vida media.

Dosis peligrosa: 1,2-2,0 gr/m<sup>2</sup>

## Plan