

Principio Activo

Vincristina

Marca

VINCRISTINA Vail 1,2 mg

Clase

Antimitóticos Alcaloides de Vinca

Indicación

Mama, ovario, pulmón microcítico, retina, LLA, LH, linfoma no folicular, LNH, meduloblastoma, melanoma, micosis fungoide, MM, neuroblastoma, osteosarcoma, púrpura trombótica isiopática,, sarcoma de Ewing, tumor de Wilms

Dosis

1,4 mg/m²

Dosis Renal

No es preciso ajustar dosis

Nefrotoxicidad

Hiponatremia por SIADH: efecto toxico directo sobre HT y neuroHPF: depósito de esferoides axonales en el ansa lenticularis , área rodeada por sustancia innominata, amigdala y núcleo supraóptico lo que interfiere con el efecto inhibidor del núcleo supraóptico.

Ocurre 1-2 semanas tras la administración. Incidencia: en diversas series entre 5,9 y 11,2%

Clínica preliminar: Ileo paralítico y parestesias.

Factor Riesgo: Ttº concomitante con azoles (voriconazol, itraconazol, posaconazol, ketoconazol) que pueden inhibir su metabolismo y aumentar su vida media.

Dosis peligrosa: 1,2-2,0 gr/m²

Plan