

Principio Activo

Leuprorelina

Marca

ELIGARD mensual 7,5 mg, trimestral 22,5 mg, semestral 45 mg
GINECRIN depot 3,75 mg
LEPTOPROL trimestral 5 mg,
LUTRATE depot mensual 3,75 mg, depor trimestral 22,5 mg
PROCRIN semestral 30 mg

Clase

Análogo de hormona liberadora de gonadotrofinas

Indicación

Próstata

Dosis

ELIGARD
Mensual 7,5 mg SC
Trimestral 22,5 mg SC
Semestral 45 mg SC
LUTRATE
Depot 3,75/mes
Depot trimestral 22,5 mg IM
PROCRIN diario: 1 mg/24 h SC
Mensual: 3,75 ng SC
Trimestral: 11,25 mg SC
Semestral: 30 mg SC

Dosis Renal

No requiere cambios

Nefrotoxicidad

HipoTA e hipoTA ortostática
No se describe nefropatía en ficha técnica ni directamente en PUBMED. Casos muy aislados de **miopatía con FRA asociado a rabdomiólisis grave**
Casos aislados en ttº combinado con bicalutamida de **FMO con FRA 2º a NIIA** que precisó HD aguda.
En algunos estudios, **el hipogonadismo farmacológico aumenta el riesgo de FRA (5,5 casos/1000 paciente/año)**, lo que se justifica por la metabolopatía 2ª (dislipemia e hiperglucemia) que puede dañar el GLM por engrosar la Membrana basal tubular y el déficit de estrógenos que disrumpe la función tubular mientras que el de testosterona, antagoniza la vasodilatación hormonal que esta produce por su acción sobre el NO.

Plan