

Principio Activo

Tafasitamab

Marca

MINJUVI Vial para perfusión IV 200 mg

Clase

Ac monoclonal humanizado anti CD19.

Indicación

Linfoma difuso de linfocitos B grandes resistentes a tratamiento o no aptos para trasplante autólogo de MO.

Dosis

12 mg/Kg/día en ciclos de 28 días: <u>Ciclo 1</u>: día 1, 4, 8, 15 y 22. <u>Ciclos 2 y 3</u>: 1, 8, 15 y 22. <u>Ciclo 4</u> hasta la progresión de la enfermedad: 1 y 15 de cada ciclo. Requiere <u style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:7pt;">pre medicación</u> con Anti H1, anti H2, antipiréticos y corticoides. Asociar lenalidomida del día 1 a 21 de cada ciclo (Mx 12 ciclos).

Dosis Renal

<u>FGe >30 mL/min</u> sin cambios. <u>FGe</u>

Nefrotoxicidad

-SLT. <u>Diarrea (36%), edema periférico (24%). Vómitos, HTA (8,6%), ITUs (12,3%).</u> <u>Hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia (muy frecuentes).</u> <u>Elevación de creatinina (elevada frecuencia).</u>

Plan