

Principio Activo

Avapritinib

Marca

AYVAKYT Cmp 25,50,100,200 y 300 mg

Clase

Inhibidor de protein quinasa

Indicación

-Tumor del estroma gastro intestinal (TEGI) irresecable o metastásico en portadores de la mutación D842V del receptor ζ del factor de crecimiento de las plaquetas (PDGFRA)

- Mastocitosis sistémica avanzada e indolente con síntomas moderados o graves no controlados con tratamiento sintomático.

Dosis

-TEGI: 300 mg/día

Administrar con estómago vacío.

Evitar en lo posible con inhibidores moderados del CYP3A, si es imprescindible disminuir dosis a 100 mg/día.

-Mastocitosis sistémica: 200 mg/día

Evitar en lo posible con inhibidores moderados del CYP3A, si es imprescindible disminuir dosis a 50 mg/día.

-Mastocitosis indolente: 25 mg/día

Dosis Renal

FGe >30: dosis plena

FGe

Nefrotoxicidad

(De cualquier grado/ grado 3 y 4 en %): **HTA** (3,3/1,1)

EDEMAS generalizados o localizados (frecuentes: facial, periorbitario, periférico, pleural y poco frecuentes: laríngeo y pericárdico)

Diarrea (26,4/6,7): total 34,7%

Náuseas (45,1/1,5).

Vómitos (24,2/0,7), total: 26,4%.

Lesión renal aguda (2/0,9).

Aumento de Creatinina (4,4/-).

Hematuria (1,1/-).

hipoalbuminemia (2,4/-), deshidratación (1,8/0,5),

Alteraciones iónicas hipofosforemia (8,9/2,5), hipopotasemia (6,0/0,9), hipomagnesemia (3,8/0,4), hiponatremia (1,3/0,7), hipocalcemia (2,2/0,4),

Plan