

## Principio Activo

Epcoritamab

## Marca

TEPKINLY Vial 4mg/0,8 mL

## Clase

Ac monoconales. Otros.  
Ac. monoclonales anti CD20/CD3

## Indicación

difuso de células grandes (LBDCG) en recaída o refractario después de 2 o más líneas de ttº sistémico.

## Dosis

Ciclos de 28 d  
**CICLO 1**: D1: 0,16 mg D8: 0,8 mg D15:48 mg D22: 48 mg  
**CICLOS 2 y3**: D1,8,15, 22:48 mg  
**CICLOS 4-9**: D1,15:48 mg  
**CICLOS 10**: D1:48 mg

## Dosis Renal

FGe >30: dosis plena FGe

## Nefrotoxicidad

- SLC (NCT03625037): 49,7%.  
- SLT  
- Frecuente de cualquier grado: Hipopotasemia (27,8% en estudio EPCORE NHL-3), hipofosforemia, hipomagnesemia.  
- Grado 3: Hipofosforemia frecuente, hipopotasemia poco frecuente (16,7% en estudio EPCORE NHL-3).  
- Edemas, diarrea y vómitos muy frecuentes (11,1% en estudio EPCORE NHL-3).  
- Elevación de Cr frecuente (no se describe el mecanismo, se intuye prerrenal).

## Plan