

Principio Activo

Epcoritamab

Marca

TEPKINLY Vial 4mg/0,8 mL

Clase

Ac monoconales. Otros.
Ac. monoclonales anti CD20/CD3

Indicación

difuso de células grandes (LBDCG) en recaída o refractario después de 2 o más líneas de ttº sistémico.

Dosis

Ciclos de 28 d
CICLO 1: D1: 0,16 mg D8: 0,8 mg D15:48 mg D22: 48 mg
CICLOS 2 y3: D1,8,15, 22:48 mg
CICLOS 4-9: D1,15:48 mg
CICLOS 10: D1:48 mg

Dosis Renal

FGe >30: dosis plena FGe

Nefrotoxicidad

- SLC (NCT03625037): 49,7%.
- SLT
- Frecuente de cualquier grado: Hipopotasemia (27,8% en estudio EPCORE NHL-3), hipofosforemia, hipomagnesemia.
Grado 3: Hipofosforemia frecuente, hipopotasemia poco frecuente (16,7% en estudio EPCORE NHL-3).
- Edemas, diarrea y vómitos muy frecuentes (11,1% en estudio EPCORE NHL-3).
- Elevación de Cr frecuente (no se describe el mecanismo, se intuye prerrenal).

Plan