

## Principio Activo

Glofitamab

## Marca

**COLUMVI** Viales de 2,5 y 10 mg infusión IV

## Clase

Ac monoconales. Otros.  
Ac. monoclonales anti CD20/CD3

## Indicación

Linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) en adultos con recaída o refractarios tras dos o más líneas de tratamiento

## Dosis

**Pauta escalonada de tratamiento:**

**CICLO 1:**

**Día 1:** pretratamiento con OBINUTUZUMAB 1000 mg en dosis única

**Día 8:** 2,5 mg

**Día 15:** 10 mg

Perfusión 4 horas

**CICLO 2:**

**Día 1:** 30 mgr en 4 horas.

**CICLOS 3 a 12:**

**Día 1:** 30 mg en 2 horas

Ciclos de 21 días. Máximo 12 ciclos.

## Dosis Renal

**CCr**:30: sin cambios

**CCr**

## Nefrotoxicidad

-Asociados a **síndrome de liberación de citoquinas (SLC)** (63% en ficha técnica).

-Asociados a **SLT**

- **Hipofosforemia:** de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: frecuente,

- **Hipomagnesemia:** de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: muy rara.

- **Hipocalcemia:** de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: muy rara.

- **Hiponatremia:** de cualquier grado frecuente, grados 3 y 4: frecuente.

Ni en ficha técnica ni en literatura médica se describen mecanismos.

- **Diarrea:** de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: muy rara,

- **Vómitos:** de cualquier grado frecuente, grados 3 y 4: muy rara.

## Plan