

Principio Activo

Glofitamab

Marca

COLUMVI Viales de 2,5 y 10 mg infusión IV

Clase

Ac monoconales. Otros.
Ac. monoclonales anti CD20/CD3

Indicación

Linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) en adultos con recaída o refractarios tras dos o más líneas de tratamiento

Dosis

Pauta escalonada de tratamiento:

CICLO 1:

Día 1: pretratamiento con OBINUTUZUMAB 1000 mg en dosis única

Día 8: 2,5 mg

Día 15: 10 mg

Perfusión 4 horas

CICLO 2:

Día 1: 30 mgr en 4 horas.

CICLOS 3 a 12:

Día 1: 30 mg en 2 horas

Ciclos de 21 días. Máximo 12 ciclos.

Dosis Renal

CCr:30: sin cambios

CCr

Nefrotoxicidad

-Asociados a **síndrome de liberación de citoquinas (SLC)** (63% en ficha técnica).

-Asociados a **SLT**

- **Hipofosforemia:** de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: frecuente,

- **Hipomagnesemia:** de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: muy rara.

- **Hipocalcemia:** de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: muy rara.

- **Hiponatremia:** de cualquier grado frecuente, grados 3 y 4: frecuente.

Ni en ficha técnica ni en literatura médica se describen mecanismos.

- **Diarrea:** de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: muy rara,

- **Vómitos:** de cualquier grado frecuente, grados 3 y 4: muy rara.

Plan