

## Principio Activo

Loncastuximab Tesirina

## Marca

**ZYNLONTA**  
Polvo para solución 10 mg

## Clase

Ac. Monoclonal anti CD19  
Anticuerpos monoclonales conjugados con fármacos

## Indicación

Linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) y linfoma B de alto grado (LBAG), en recaída o refractario tras dos o más líneas de tt° sistémico.

## Dosis

**2 1° ciclos**: 0,15 mg/kg/21 d  
**¿ 3° ciclo**:  
0,075 mg/kg/21 d  
Suspender si neutrófilos

## Dosis Renal

**>30**: dosis plena  
**<30**

## Nefrotoxicidad

**Edemas graves** (23,3% en FT, en estudio LOTIS-2: 33,3%)  
**Derrame pleural** (1,9%)  
**Diarrea**: 27,8 % cualquier grado y 5,6% grado ¿3 en estudio LOTIS-2.  
**Vómitos**: 19,4% cualquier grado en estudio LOTIS-2.  
**Hipofosfatemia**: 15% cualquier grado y 11% grado ¿3 en estudio LOTIS-2.  
**Hipopotasemia**: 19,4% cualquier grado y 5,6% grado ¿3 en estudio LOTIS-2.  
**Hipomagnesemia**: 16,7% cualquier grado y 2,8% grado ¿3 en estudio LOTIS-2.  
No se especifica su mecanismo de acción.

## Plan