

Principio Activo

Loncastuximab Tesirina

Marca

ZYNLONTA
Polvo para solución 10 mg

Clase

Ac. Monoclonal anti CD19
Anticuerpos monoclonales conjugados con fármacos

Indicación

Linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) y linfoma B de alto grado (LBAG), en recaída o refractario tras dos o más líneas de tt° sistémico.

Dosis

2 1° ciclos: 0,15 mg/kg/21 d
¿ 3° ciclo:
0,075 mg/kg/21 d
Suspender si neutrófilos

Dosis Renal

>30: dosis plena
<30

Nefrotoxicidad

Edemas graves (23,3% en FT, en estudio LOTIS-2: 33,3%)
Derrame pleural (1,9%)
Diarrea: 27,8 % cualquier grado y 5,6% grado ¿3 en estudio LOTIS-2.
Vómitos: 19,4% cualquier grado en estudio LOTIS-2.
Hipofosfatemia: 15% cualquier grado y 11% grado ¿3 en estudio LOTIS-2.
Hipopotasemia: 19,4% cualquier grado y 5,6% grado ¿3 en estudio LOTIS-2.
Hipomagnesemia: 16,7% cualquier grado y 2,8% grado ¿3 en estudio LOTIS-2.
No se especifica su mecanismo de acción.

Plan