

Principio Activo

Melflufen (melfalan flufenamida)

Marca

PEPAXTI
Polvo para solución 20 mg

Clase

Alquilantes. Inhibidores síntesis DNA

Indicación

En combinación con dexametasona para adultos con mieloma múltiple resistente a tres líneas de tratamientos que incluyan un inhibidor del proteosoma, un inmunomodulador y un Ac monoclonal anti-CD38, y con progresión de la enfermedad.

Dosis

***Si PESO 60 kg:** 40 mg
Ambos el día 1 de cada ciclo de 28 días.
Asociar a dexametasona: 40 mg IV de los días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo.
(En > 75 años 20 mg).
Ante reacción adversa (1^a-2^a. 3^a): reducir dosis:
Inicial 40- 30-20-15- Suspender si no tolera 15 mg
Inicial 30-20-15. Suspender si no tolera 15 mg.

Dosis Renal

-FGe>45: dosis plena
-FGe 30-45: 30 mg
-FGe

Nefrotoxicidad

-Diarrea 19%
-Hipopotasemia: frecuente.
-Hipofosfatemia 5%
-FRA (2%)
- Melflufen (melfalan- flufenamida) es un MELFALAN inactivo que se activa dentro de las células del mieloma al escindir las aminopeptidasas el fármaco del péptido, lo que limita su toxicidad general y renal.

Plan