



## Principio Activo

Neratinib

## Marca

**NERLYNX** Cmp 40 mg

## Clase

Inhibidores de proteinquinasa  
Inhibidores de la Tirosin quinasa del HER2  
Inhibidores de la Tirosin quinasa del HER4  
Inhibidores de la Tirosin quinasa del EGFR.

## Indicación

Mama HER-2 positivo que hayan finalizado ttº adyuvante con trastuzumab hace al menos 1 año.

## Dosis

240 mg/d/ durante 1 año.  
Dosis matutina, administrado con alimentos (absorción lenta, máxima cocentración en 7 horas).  
Se debe suspender ante efectos indeseables grado 4 ó cualquier otro que no regresen a grado 0-1, si se precisa suspender el ttº más de 3 semanas, si no tolera dosis de 120 mg/d.  
Modificar dosis a 200-160-120 mg ante efectos indeseables 1º, 2º ó 3º.

## Dosis Renal

-FGe; 30 mL/min: dosis plena  
-FGe98%.  
Metabolización por el CYP3A4.  
Excreción fecal.

## Nefrotoxicidad

-Diarrea 94,5%, 39,9% grado ≥3, que suele aparecer durante las 1ª (83,6%) ó 2ª semana y puede ser grave.  
-Vómitos.  
- Fallo renal agudo grave (1,2%) no se especifica causa ni en FT, IPT ni en revisiones de la literatura en PubMed a fecha 30/4/24 pero por el resto de efectos indeseables podría ser prerrenal establecido.  
-Edema periferico (21%).  
-Hipopotasemia 11%.  
-Infección tracto urinario 15%.

## Plan