



Principio Activo

Clofarabina

Marca

EVOLTRA 20 mg solución para perfusión.

Clase

-Análogos de purinas. -Inhibidor de la síntesis de DNA.

Indicación

LLA en

Dosis

* >1 año: 52 mg/m² SC/d mediante perfusión IV en 2 horas, durante 5 días consecutivos. Ciclos cada 2-6 semanas.

Dosis Renal

-CCr ≥60 mL/min: dosis plena
-CCr 30-59 mL/min: disminuir dosis 50%
-CCr

Nefrotoxicidad

-**FRA** (8% grados 3-4 FT; 1-5% grados 3-4 en PMID:22585697; 21% en ensayo fase 1-2 ,PMID: 22079470, 16% en PMID: 29266189). Revisión literatura: 10-42% , grave: 6-19% (PMID: 24081220). **% con** dosis >30-40 mg/m², mayor pico de concentración sérica y en pacientes añosos. En base a su mecanismo de acción (inh, de ribonucleótido reductasa y anulación de la reparación mitocondrial) se especula con lesiones del tipo **GNFyS colapsante y NTA grave** (PMID: 24081220).
-**Proteinuria** (PMID: 21923594).
-**SLT** (Sde. lisis tumoral)
-**SCL** (Sde de extravasación capilar) (1-4%).
-**SRIS** (Sde respuesta inflamatoria sistémica)
-**SLC** (Sde liberación de citoquinas)
-**HipoTA**.
-**HTA**
- **Náuseas** (61%), **vómitos** (59%) y **diarrea** (20%).
-**Hiponatremia**.
-**Edemas**
-**Hematuria** (13% FT).

Plan