



Principio Activo

Lazertinib

Marca

LAZCLUZE Comp 80 mg y 240 mg

Clase

Inhibidores de proteín quinasa
Inhibidores de la tirosin quinasa deL EGFR

Indicación

En combinación con amivantamab (Inhibidor dual TKI EGFR/ MET): 1ª línea de Ca. de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con deleciones en el exón 19 del **EGFR** o mutaciones de sustitución L858R en el exón 21.

Dosis

240 mg/d (con/sin alimentos). Tragar los comprimidos enteros, sin triturar o machacar. Cuando coincida en el mismo día la administración de amivantamab, tomar antes, en cualquier momento, lazertinib.
En función del tipo de toxicidad y grado de la misma se puede reducir la dosis a 180 ó 80 mg diarios, debiendo suspender el tratamiento si la toxicidad no revierte tras 3 reducciones de dosis. Consultar ficha técnica.

Dosis Renal

Dosis plena en FGe ≥ 30 , precaución entre 15-29; no se disponen de datos en

Nefrotoxicidad

Cuando se combina con amivantamab su toxicidad es la derivada de la inhibición de EGFR y de MET conjuntamente.
Edemas (47%), en relación a amivantamab
Diarrea (29%), hipocalcemia (21%), hiponatremia grave (1,2%), hipopotasemia (14%), hipomagnesemia (5%).
Estudios preclínicos en ratas y perros demostraron: dilatación tubular, necrosis papilar, elevación de
la concentración de urea, creatinina (solo hembras), de fósforo inorgánico y de potasio (F.T.).

Plan