Diccionario de Quimioterápicos y nefrotoxicidad

Principio Activo:Sacituzumab govitecan

Marca:

TRODELVY

Ampollas 200 mg
Clase:

Ac. monoclonales conjugados con fármacos

Inhidores de topoisomerasa I

Indicación
10 mg/Kg/semana los días 1 y8 de un ciclo de 21. Precisa premedicación con Anti H1, antipirético, corticoide y antiemético.
Dosis Renal

Iª renal leve: dosis plenaIª renal moderada, avanzada y HD: sin estudios aunque el fármaco posee una mínima eliminación renal.

Nefrotoxicidad
FRA prerrenal por diarrea/vómitos (38%, graves 3%), **ITUs** (15%), ITUs graves (1,1%), **hipopotasemia** (28,1%), hipopotasemia grave (1,4%), **hipomagnesemia** (15%), hipomagnesemia grave (0,3%), **hipofosforemia** (8,7%), hipofosforemia grave (5,2%), **hipocalcemia** (7,1%), hipocalcemia grave (0,8%). **Hematuria** (2,7%), hematuria grave (0,3%).
b>Plan

Precauciones universales, monitorización de TA, FG, iones y orina y especial cuidado con las interacciones:

Inh UGT1A1 (Propofol, ketoconazol, inh TQ del EGFR): aumentan su concentración.

Inductores de la UGT1A1 (Carbamacepina, fenitoína, rifampicina, ritonavir, tipranavir): disminuyen su concentración