

Diccionario de Quimioterápicos y nefrotoxicidad

Principio Activo:Tucatinib

Marca:

TUKYSA 50,150 mg cmp

Clase:

Inhibidores de proteínquinasa

Inhibidores de la tirosin quinasa del HER2

Indicación

300 mg/12 horas

Dosis Renal

No requiere ajuste de dosis

Nefrotoxicidad

Interacciona con sustratos del **CYP2C8, CYP3A y gpP**: rifampicina, DFH, hierba de San Juan, carbamacepina, gemfibrocilo, itraconazol. Midazolam, alfentanilo, avanafil, buspirona, darifenacina, darunavir, ebastina, everólimus, ibrutinib, lomitapida, lovastatina, midazolam, naloxegol, saquinavir, simvastatina, sirólimus, tacrólimus, tipranavir, triazolam y vardenafil, dabigatran.

FRA PRERRENAL por diarrea que puede ser grave,

Pseudo FRA por inhibición de la secreción tubular de los transportadores OCT 2 y MATE (**aumento medio de Crp del 30%**, en el **13,9%** de pacientes ya en el primer ciclo y reversible).

b>Plan

Control periódico de TA, FG y iones.

Ante daño prerrenal, soporte médico adecuado.

Reposición hidroelectrolítica si diarrea.

Es aconsejable medir el FGe por métodos alternativos a la creatinina como por ejemplo la cistatina C.

Si efectos indeseables que requieran disminuir dosis hacerlo de 50 en 50 mg hasta 150 mg/día