



Navegador temático del conocimiento nefrológico.

Editores: Dr. Víctor Lorenzo y Dr. Juan Manuel López-Gómez

ISSN: 2659-2606

Edición del Grupo Editorial Nefrología de la Sociedad Española de Nefrología.



Sociedad
Española de
Nefrología

Glomerulonefritis Fibrilar e Inmunotactoide

Xavier Fulladosa ^a

a Servicio de Nefrología, Hospital Universitari de Bellvitge, IDIBELL, L'Hospitalet, Barcelona

INTRODUCCIÓN

La glomerulonefritis fibrilar y la inmunotactoide forman parte de un grupo de nefropatías caracterizadas por la presencia de depósitos inmunes organizados glomerulares, de apariencia ultraestructural fibrilar o microtubular, rojo congo negativo (no amiloide) [\[1\]](#).

Son enfermedades raras, diagnosticándose en 1% de las biopsias renales, siendo proporcionalmente más frecuente la glomerulonefritis fibrilar que la inmunotactoide [\[1\]\[2\]\[3\]](#)

Aunque desde su primera mención en la década de los setenta [\[4\]](#) ha habido controversia sobre si eran o no variantes de una misma enfermedad, actualmente existe unanimidad en considerarlas entidades diferentes, con distinta patogenia y particularidades clínicas e histopatológicas propias ([Tabla 1](#)). Siguen existiendo sin embargo casos de overlap difíciles de clasificar.

GLOMERULONEFRITIS FIBRILAR

Se define como una glomerulopatía por depósito de fibrillas de distribución aleatoria y de unos 12-24 nm de diámetro en el estudio ultraestructural, derivadas de inmunoglobulinas (inmunofluorescencia positiva para IgG) y no amiloide (rojo congo negativo) [\[5\]](#)

Presentación clínica

Afecta predominantemente a pacientes caucásicos, en la sexta década de la vida [\[5\]](#).

La clínica es inespecífica, siendo la proteinuria su principal manifestación, a menudo en forma de síndrome nefrótico (36-70%). En el momento de su diagnóstico, suele presentar insuficiencia renal en grado variable (54-70%), microhematuria (70-80%) e hipertensión arterial (67%) [\[5\]\[6\]](#). Los valores de complemento sérico son normales. Aunque de forma poco frecuente puede presentarse en forma de insuficiencia renal rápidamente progresiva [\[7\]\[8\]](#). No suele presentar manifestaciones extrarrenales.

Se ha descrito como una glomerulopatía primaria, aunque en determinados casos aparece coincidente o relacionada a diversas patologías, como neoplasias sólidas (4-23%), infección por VHC (3-27%), (principalmente en pacientes afroamericanos), y enfermedades autoinmunes (10-30%) [\[9\]\[10\]](#). Su asociación

directa con gammaglobulina monoclonal se considera excepcional [11].

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza mediante biopsia renal, en el estudio de una nefropatía proteinúrica.

A nivel histológico [12], se observa en la microscopía óptica un patrón predominantemente mesangial con expansión por depósitos eosinófilos (Figura 1), con positividad variable en la tinción de PAS, escasa tinción en plata-metenamina, y por definición, Rojo congo negativos. Se acompaña de esclerosis y/o proliferación mesangial variables. También puede presentarse como un patrón membranoproliferativo, con dobles contornos segmentarios, asociado a la expansión mesangial, pudiendo ser una forma evolucionada de la enfermedad, como sugiere el hecho de que se ha reportado la transformación de una forma a otra en biopsias seriadas [13]. Con menor frecuencia se puede presentar como una forma “membranous like” o proliferativa endocapilar, generalmente sobre una base de expansión y proliferación mesangial. Un 25% de los casos pueden presentar semilunas fibroepiteliales, aunque la presencia de semilunas difusas (> 50%) es rara.

La inmunofluorescencia directa muestra un depósito intenso mesangial y en pared capilar de un característico aspecto desflecado o “borroso” con IgG polítipica (predominantemente IgG4 y/o IgG1) y C3 (asociado o no a C1q), habitualmente sin restricción de cadena ligera (Figura 2). En aquellos casos donde la inmunofluorescencia directa realizada sobre tejido congelado muestra restricción de cadena ligera (principalmente si es lama) es necesario ampliar el estudio inmunohistoquímico sobre tejido en parafina previo tratamiento con pronasa para desenmascarar un patrón polítipico. Aplicado este proceso a la biopsia renal, la caracterización de esta entidad como monotípica es excepcional (1%) [11].

En la microscopía electrónica se identifican los depósitos organizados mesangiales y/o en la lámina densa de la membrana basal glomerular, de fondo amorfo con fibrillas de disposición aleatoria de 12-24 nm de diámetro [1] (Figura 3).

Clásicamente, la glomerulonefritis fibrilar requería para su diagnóstico del estudio ultraestructural mediante microscopía electrónica. Actualmente, desde su descripción en 2018 disponemos de la tinción por DNAJB9 [14][15], principalmente mediante inmunohistoquímica, con una gran sensibilidad (98%) y especificidad (>99%) para el diagnóstico histológico de la glomerulonefritis fibrilar [16]. Presenta un patrón de depósito glomerular similar al de la IgG (Figura 4). La tinción por inmunohistoquímica de DNAJB9 se ha convertido en una herramienta básica para el diagnóstico histológico de la glomerulonefritis fibrilar de tal forma que hoy en día ya no es imprescindible el estudio ultraestructural [12]. Además, comparada con la microscopía electrónica, tiene las ventajas de ser una técnica más fácil, rápida, económica y accesible, y que se puede realizar sobre muestra en parafina.

Así como la tinción inmunohistoquímica del DNAJB9 en la biopsia renal se ha aceptado como un método diagnóstico de gran utilidad, la determinación de los niveles séricos de DNAJB9 no parecen aportar hoy en día un beneficio como biomarcador sérico de la enfermedad. Aunque los pacientes con glomerulonefritis fibrilar presentan valores séricos significativamente más elevados de DNAJB9, no se relacionan con la actividad de la enfermedad ni la respuesta al tratamiento, y se correlacionan negativamente con los valores de filtrado glomerular [17][18][19].

Ante la posible asociación con diversos procesos subyacentes, se recomienda en el momento del diagnóstico realizar un cribado de neoplasia, apropiado por la edad y características del paciente, determinación de serologías del VHC y un estudio de autoinmunidad tanto clínico como serológico.

Clásicamente, se había incluido a la glomerulonefritis fibrilar considerada monoclonal, aquella coincidente con gammaglobulina monoclonal y/o con aparente restricción de cadenas ligeras en la inmunofluorescencia sobre tejido congelado, dentro del grupo de gammaglobulinas monoclonales de significado renal [20]. Actualmente, con

la amplia utilización de técnicas de inmunohistoquímica sobre tejido parafinado tratado con pronasa y de tinción para subclases de IgG se ha evidenciado que la gran mayoría de los casos aparentemente monotípicos son de estirpe policlonal, y la presencia de gammapatía monoclonal parece ser más coincidente que patogénica. Solamente hay casos excepcionales (1%) [11] en los que sí se demuestran depósitos monotípicos tras el estudio completo histológico [21][22]. Aun así, en 10% de estos pocos casos se detecta una paraproteína circulante, proporción similar a la de los casos policloniales. Es por esto por lo que en recientes revisiones sobre las gammapatías monoclonales de significado renal, la glomerulonefritis fibrilar queda excluida de este grupo [23]. Estos casos monotípicos suelen ser DNAJB9 negativos y con rasgos clínicos e histológicos similares a los de la glomerulonefritis inmunotactoide [24].

El principal diagnóstico diferencial debe realizarse con la glomerulopatía inmunotactoide, la cual no tiñe con DNAJB9, y con la amiloidosis, aunque por definición los depósitos en la glomerulonefritis fibrilar son rojo Congo y tioflavina negativos (Figura 5). De todas formas, se han descrito contados casos de glomerulonefritis fibrilar congofílica, DNAJB9 positivos, que suponen un evidente reto diagnóstico [25].

Etiopatogenia

Se considera una enfermedad por depósitos de inmunocomplejos, aunque la naturaleza de éstos sigue siendo motivo de estudio. Las fibrillas están compuestas por IgG (eminente polyclonal) y DNAJB9, que colocaliza con la IgG [14][15].

El DNAJB9 (DNAJ homolog subfamily B member 9, también conocido como ERDJ4) es una proteína de 223 aminoácidos miembro de la familia de las chaperonas DNAJ, que actúa como cochaperona de HSP70 (heat shock protein 70), activándose en situaciones de estrés celular y de estrés del retículo endoplásmico. Como chaperona, participa facilitando el correcto plegamiento y ensamblaje de las proteínas sintetizadas, imprescindible para una adecuada conformación tridimensional y función. Es una proteína ubicua en el organismo en condiciones fisiológicas, presente principalmente en hígado, placenta y riñón, y en éste en células tubulares, mesangiales y podocitos [9][26].

Se ha demostrado que aparece en elevadas cantidades a nivel glomerular en la glomerulopatía fibrilar, y se considera que puede tener un papel relevante en su patogenia [15][16]. Hay diversas hipótesis de su papel en el desarrollo de esta nefropatía, aunque aún con mucha incertidumbre al respecto: una primera teoría es que el DNAJB9, sintetizado de forma aberrante a nivel extrarrenal, actuaría como un autoantígeno que desencadenaría una respuesta autoinmune activando la síntesis de autoanticuerpos (IgG4 predominante), con depósito o generación de inmunocomplejos a nivel glomerular (de todas formas, no se han podido identificar autoanticuerpos circulantes contra el DNAJB9). Una segunda teoría postula que el DNAJB9 es una proteína que se une secundariamente a moléculas de IgG aberrantes sintetizadas con defectos de plegamiento y depositándose a nivel glomerular [9][12]. Los depósitos glomerulares tienen determinadas características fisicoquímicas que les confieren capacidad fibrilogénica y desencadenamiento de la reacción inflamatoria y daño local.

Tratamiento

Actualmente no disponemos de un tratamiento específico eficaz para esta nefropatía. Todos los pacientes deben ser tratados de base con bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) si no hay contraindicación, buscando un adecuado control de la tensión arterial como en cualquier nefropatía proteinúrica.

Al tratarse de una enfermedad de trasfondo autoinmune o derivada del depósito de inmunoglobulinas aberrantes se han ensayado diversas estrategias inmunosupresoras. Diferentes pautas con esteroides en monoterapia o asociados a ciclofosfamida, micofenolato o anticalcineurínicos, recogidas en series de casos o

estudios retrospectivos, han mostrado resultados dispares y poco consistentes, con una escasa eficacia en conseguir la remisión o evitar la progresión de la enfermedad. Se han reportado series con índices de remisión completa o parcial de 13% y 30% respectivamente, con tratamiento con bloqueo del SRAA independientemente de tratamiento inmunosupresor [13][27].

Considerando la naturaleza inmune de la enfermedad, una potencial opción terapéutica son las terapias dirigidas al linfocito B, con anticuerpos anti-CD20. El rituximab se ha ido utilizando de forma progresiva con respuestas irregulares, experiencia recogida en estudios retrospectivos con pocos pacientes, sin ensayos controlados debido a la rareza de la nefropatía. Mientras algunas series han reportado remisiones parciales en una proporción significativa de sus pacientes tratados [28][29], otras han reflejado resultados menos optimistas en términos de retrasar la progresión de la enfermedad [10][30]. Un estudio piloto prospectivo abierto con 11 pacientes con rituximab dosis de 1 g quincenales, repetido a los 6 meses, observaron que a los 12 meses de seguimiento los pacientes mantenían una estabilidad de la función renal, aunque sin un cambio significativo de la proteinuria, consiguiendo solamente 3 de ellos una remisión parcial. Estos resultados deben interpretarse sin embargo dentro de un seguimiento de solamente un año, relativamente corto para esta nefropatía [19]. Una serie retrospectiva con 266 pacientes, 30 de ellos tratados con inmunosupresión, ocho con rituximab, el uso de este fármaco fue el único que se asoció de forma significativa a la no progresión hacia enfermedad renal crónica avanzada en el seguimiento evolutivo [31].

No disponemos de claros marcadores que orienten a que pacientes tratar y a cuáles no con tratamiento inmunosupresor. La decisión de utilizar tratamiento inmunosupresor, basado en opinión y con un escaso nivel de evidencia, depende en buena medida de la severidad en el momento de su presentación y de la evolución, así como de las características histológicas. En general, los casos con función renal conservada (filtrado glomerular ≥ 60 ml/min) y proteinuria no nefrótica se pueden manejar de inicio con tratamiento conservador con bloqueo del SRAA. En los casos con síndrome nefrótico y/o con deterioro progresivo de la función renal, sin daño crónico histológico significativo, se recomienda ensayar tratamiento inmunosupresor, siendo el rituximab el fármaco que genera mayor consenso hoy en día, siempre sopesando riesgo-beneficio y de acuerdo con el paciente, y con el objetivo de al menos conseguir un enlentecimiento de la progresión de la nefropatía.

Aquellos casos que se presentan como una insuficiencia renal rápidamente progresiva y/o con reacción extracapilar difusa en el estudio histológico se suelen tratar de forma agresiva con dosis elevadas de glucocorticoides y ciclofosfamida, aunque suelen presentar un mal pronóstico renal.

En los casos en los que se sospeche relación con una neoplasia, infección por VHC o enfermedad autoinmune subyacente se recomienda inicialmente tratar el proceso subyacente ya que en determinados casos se ha descrito que su control ha conseguido mejorar la nefropatía.

El pronóstico de la glomerulonefritis fibrilar es en general malo, con la mitad de los pacientes requiriendo tratamiento renal sustitutivo a los 3-5 años del diagnóstico [1][2][13][27]. Como en otras nefropatías, las mejores respuestas aparecen en aquellos casos con mejor función renal en el diagnóstico, sugiriendo que el tratamiento precoz de la nefropatía es importante, antes de que desarrolle un punto de no retorno. Los principales factores de mal pronóstico son la edad, la función renal, el grado de proteinuria y la presencia de un patrón membranoproliferativo, daño crónico o reacción extracapilar en la biopsia renal [13][27][31].

Cuando la nefropatía progresiona hacia requerimiento de tratamiento renal sustitutivo, el trasplante renal es una buena opción si no hay otra contraindicación. La glomerulonefritis fibrilar puede recidivar en aproximadamente una quinta parte de los injertos, pero habitualmente su presentación suela ser tardía (>5 años) y más leve, con escasa repercusión clínica y una evolución más lenta en el tiempo que en el riñón nativo [32]. La supervivencia del injerto ronda el 67% a los 10 años, similar al de pacientes transplantados por otras nefropatías [33].

GLOMERULOPATÍA INMUNOTACTOIDE

Se define como una nefropatía por depósito glomerular de estructuras microtubulares de distribución aleatoria y de 15-50 nm de diámetro en el estudio ultraestructural, derivadas de inmunoglobulinas (inmunofluorescencia positiva para IgG) y no amiloide (rojo congo negativo) [34]

Presentación clínica

Descripción en el 1980 por Schwartz et al [35] es unas 10 veces menos frecuente que la glomerulonefritis fibrilar (0,1% de las biopsias de riñón nativo) [1][34]. Predomina también en pacientes caucásicos, alrededor de la sexta década de la vida.

Se presenta con un patrón clínico similar a la glomerulonefritis fibrilar, con proteinuria, a menudo con síndrome nefrótico, microhematuria, insuficiencia renal en grado variable, e hipertensión arterial, aunque a diferencia de aquella con una mayor incidencia de hipocomplementemia, por la vía clásica, en una tercera parte de los casos [34][36]. No suele presentar tampoco manifestaciones extrarrenales.

Se asocia de manera más frecuente con enfermedades hematológicas, principalmente con síndromes linfoproliferativos indolentes tipo leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas, y con menor frecuencia con otros linfomas B o mieloma múltiple [34].

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza mediante la biopsia renal, con la identificación de los característicos depósitos con estructuras microtubulares en el estudio ultraestructural, habitualmente de >30 (15-50) nm de diámetro de disposición paralela o apilada, y con un hueco central a gran aumento. Se localizan a nivel subepitelial y también subendotelial y mesangial (Figura 6) [36].

Ópticamente suelen presentar un patrón membranoproliferativo o un patrón membranoso atípico, con mayor o menor proliferación mesangial y/o endocapilar. Característicamente son rojo congo y DNAJB9 negativos [36].

La inmunofluorescencia objetiva depósitos intensos parietales y mesangiales de IgG predominante (principalmente IgG1), C3 y C1q. Los depósitos son generalmente monotípicos con restricción de cadena ligera (70%), básicamente kappa. La inmunohistoquímica sobre tejido parafinado tratado con pronasa puede ayudar a corroborar el diagnóstico y confirmar o descartar la monotipia desenmascarando depósitos no identificados en la inmunofluorescencia sobre tejido congelado [37].

La frecuente presentación con depósitos monoclonales condiciona que se hable de dos variantes de esta nefropatía [34], una variante monoclonal de la glomerulopatía inmunitactoide, la cual se incluye dentro del grupo de las gammapatías monoclonales de significado renal [23], y una variante policlonal.

La presencia de la variante monoclonal obliga en el momento del diagnóstico a descartar la presencia de gammapatía monoclonal si ésta no ha sido ya diagnosticada con anterioridad [36]. Aun así, debe considerarse que el estudio de gammapatía monoclonal puede ser normal, y que la glomerulopatía inmunitactoide puede desarrollarse sin que se llegue a detectar ningún componente monoclonal en suero u orina por las técnicas habituales. En los casos policlónicos, un porcentaje (25%) puede estar relacionado con enfermedades autoinmunes, por lo que se recomienda su despistaje en estos casos [34].

El principal diagnóstico diferencial debe realizarse con la glomerulonefritis crioglobulinémica tipo I, con la glomerulonefritis proliferativa por depósitos inmunes monoclonales y con la glomerulonefritis fibrilar

(Figura 5).

La distinción entre la glomerulonefritis fibrilar y la inmunotactoide no siempre es clara y determinados casos se pueden solapar con los estudios anatopatológicos disponibles. Algunos casos con glomerulonefritis con depósitos fibrilares monotípicos, DNAJB9 negativos, muestran características clínicas e histológicas más propias de la glomerulopatía inmunotactoide, a pesar de no mostrar en el estudio ultraestructural los característicos microtúbulos de esta entidad [22].

Etiopatogenia

Los depósitos glomerulares se generan por la cristalización anómala de las inmunoglobulinas-inmunocomplejos o las inmunoglobulinas monoclonales depositadas, capaces de formar microtúbulos o estructuras tactoides por sus características estructurales y sus propiedades fisicoquímicas específicas, todo ello favorecido por el proceso fisiológico de la ultrafiltración (en entornos concentrados hay mayor tendencia a generar estructuras cristalinas tactoides) [38]. En cuanto a los depósitos policloniales, se hipotetiza que puedan deberse al depósito de proteínas no identificadas con capacidad intrínseca de polimerizar en microtúbulos, con una respuesta secundaria autoinmune similar a lo propuesto para la glomerulonefritis fibrilar y el DNAJB9 [34].

Tras el depósito y la formación de las estructuras tactoides, parte de la lesión se considera mediada por la activación del complemento [39].

Tratamiento

Como el resto de las glomerulopatías con proteinuria debe tratarse con bloqueo del SRAA si no hay contraindicación, con un adecuado control de la tensión arterial.

Ya que un porcentaje relevante de casos están asociados a una gammopathía monoclonal, el tratamiento se basa en una terapia dirigida a la alteración hematológica de base identificada [36]. En los casos monoclonales en los cuales no se identifica una gammopathía monoclonal, se recomienda iniciar tratamiento inmunosupresor empírico con rituximab, ante una posible clona linfocítica oculta subyacente, reservando pautas dirigidas a la célula plasmática como segunda línea.

En los casos policloniales, si presenta manifestaciones renales leves se puede mantener tratamiento conservador con inhibición del SRAA y un seguimiento estrecho. En los casos más severos con proteinuria nefrótica y/o insuficiencia renal progresiva, el tratamiento no está bien definido, aunque se recomienda el tratamiento con rituximab sopesando riesgo-beneficio en cada caso.

En los casos con una insuficiencia renal evolucionada con marcada lesión crónica histológica y escasa probabilidad de recuperación, el tratamiento inmunosupresor o quimioterápico dirigido a la clona debería reservarse para aquellos pacientes candidatos a trasplante renal para preservar en la medida de lo posible la evolución a largo plazo del injerto [40].

La variante monoclonal de la glomerulopatía inmunotactoide, cuando se asocia a enfermedad hematológica, presenta un mejor pronóstico que la variante policlonal. Las manifestaciones renales y el pronóstico de la nefropatía están estrechamente ligados a la evolución de la discrasia hematológica tras el tratamiento. La consecución de una buena respuesta hematológica se traduce habitualmente en una mejoría de los parámetros renales, y las recurrencias renales suelen ser un reflejo de recidivas hematológicas. El objetivo pues es conseguir una buena y sostenida remisión de la enfermedad hematológica [36].

Cuando la nefropatía progresiona a requerimiento de tratamiento sustitutivo renal el trasplante renal es una buena opción. Los índices de recurrencia sobre el injerto son del 50-60% de los casos, a veces precoces,

similar a lo que ocurre con otras nefropatías por depósito asociadas a discrasias hematológicas [6][41]. Es importante llegar al trasplante renal con una buena respuesta hematológica y mantener un seguimiento regular hematológico posterior para reducir el riesgo de recidiva sobre el injerto [36].

Tablas

Tabla 1 – Diferencias entre la glomerulonefritis fibrilar y la inmunotactoide

(LLC: leucemia linfocítica crónica; LLCP: linfoma linfocítico de células pequeñas; GMSR: gammaglobulina monoclonal de significado renal; SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona)

Glomerulopatía...	FIBRILAR	INMUNOTACTOIDE
Prevalencia	Enfermedades raras: Glomerulopatía FIBRILAR >> (x10) que INMUNOTACTOIDE	
Clínica	Proteinuria (\pm síndrome nefrótico), insuficiencia renal, microhematuria, hipertensión arterial Complemento Normal	Hipocomplementemia (33 %) Gammaglobulina monoclonal (63-67 %)
Asociación	Neoplasias sólidas Enfermedades autoinmunes Virus de la hepatitis C	Síndrome linfoproliferativo B indolente (LLC/LLCP) GMSR
Histología	Tinción Rojo Congo NEG; Inmunofluorescencia directa POS para IgG DNAJB9 POS ME: fibrillas disposición aleatoria, \varnothing 12-24 (20) nm Politípico [$< 1\%$ monotípico]	DNAJB9 NEG ME: microtúbulos disposición paralela, con " <i>hueco central</i> ", \varnothing >30 (15-50) nm Monotípico ($\approx 70\%$)
Tratamiento	Bloqueo del SRAA ? Rituximab	Bloqueo del SRAA Específico dirigido a la clona (si identificada)
Trasplante	Recurrencia $\approx 20\%$	Recurrencia 50-60%

Tabla 1.

Figuras

Figura 1. Expansión mesangial global con cierto engrosamiento de la membrana basal glomerular y leve proliferación mesangial segmentaria (hematoxilina-eosina) (figura cedida por la Dra. Montserrat Gomá)




Figura 1.

Figura 2. Inmunofluorescencia directa sobre tejido congelado, con intensa tinción para IgG de aspecto mal definido o “borroso” en mesangio y pared capilar glomerular
(figura cedida por la Dra. Montserrat Gomá)




Figura 2.

Figura 3. Microscopía electrónica, con depósitos con fibrillas de disposición aleatoria (cabeza de flecha) en la membrana basal glomerular, en esta imagen de disposición predominante subepitelial (figura cedida por la Dra. Montserrat Gomá)




Figura 3.

Figura 4. Inmunohistoquímica con una marcada y mal definida tinción para DNAJB9 a nivel glomerular (figura cedida por la Dra. Montserrat Gomá)




Figura 4.

Figura 5. Algoritmo diagnóstico anatomoabiológico ante la sospecha de enfermedad glomerular por depósitos estructurados (IHQ: inmunohistoquímica; LES: lupus eritematoso sistémico).



Figura 5.

Figura 6. Microscopía electrónica de Glomerulopatía inmunotactoide. Se observan depósitos con estructuras microtubulares de disposición paralela, con un hueco central a mayor aumento (cabeza de flecha). (figura cedida por la Dra. Montserrat Gomà, 6




Figura 6.

Referencias bibliográficas

- 1 . Rosenstock JL, Markowitz GS, Valeri AM, Sacchi G, Appel GB, D'Agati VD. Fibrillary and immunotactoid glomerulonephritis: Distinct entities with different clinical and pathologic features. *Kidney Int.* 2003 Apr;63(4):1450-61.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2003+Apr%3B63%284%29%3A1450%29>
- 2 . Iskandar SS, Falk RJ, Jennette JC. Clinical and pathologic features of fibrillary glomerulonephritis. *Kidney Int.* 1992 Dec 1;42(6):1401-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=1992+Dec+1%3B42%286%29%3A1401%29>
- 3 . Fogo A, Qureshi N, Horn RG. Morphologic and Clinical Features of Fibrillary Glomerulonephritis Versus Immunotactoid Glomerulopathy. *Am J Kidney Dis.* 1993;22(3):367-77.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=1993%3B22%283%29%3A367%29>
- 4 . Rosenmann E, Eliakim M. Nephrotic syndrome associated with amyloid like glomerular deposits. *Nephron.* 1977;18(5):301-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=1977%3B18%285%29%3A301%29>
- 5 . Rosenstock JL, Markowitz GS. Fibrillary Glomerulonephritis: An Update. *Kidney Int Rep.* 2019 Jul 1;4(7):917-22.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2019+Jul+1%3B4%287%29%3A917%29>
- 6 . Pronovost PH, Brady HR, Gunning ME, Espinoza O, Rennke HG. Clinical features, predictors of disease progression and results of renal transplantation in fibrillary/immunotactoid glomerulopathy. *Nephrol Dial Transplant.* 1996 May 1;11(5):837-42.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=1996+May+1%3B11%285%29%3A837%29>
- 7 . Choung HYG, Grewal R, Goldman B. A rare case of diffuse crescents in fibrillary glomerulonephritis. *Clin Nephrol.* 2022 Jan 1;97(1):53-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2022+Jan+1%3B97%281%29%3A53%29>
- 8 . Javaugue V, Said SM, Bu L, Bridoux F, François A, Goujon JM, et al. Prognostic Value of Diffuse Crescentic Lesions in Fibrillary Glomerulonephritis. *Am J Kidney Dis.* 2023 Mar;81(3):368-70.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2023+Mar%3B81%283%29%3A368%29>
- 9 . Klomjai N, Alexander MP, Zand L. Fibrillary Glomerulonephritis and DnaJ Homolog Subfamily B Member 9 (DNAJB9). *Kidney360.* 2020 Sep 24;1(9):1002-13.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2020+Sep+24%3B1%289%29%3A1002%E2%80%9313>

10 . Schober FP, Jobson MA, Poulton CJ, Singh HK, Nickeleit V, Falk RJ, et al. Clinical Features and Outcomes of a Racially Diverse Population with Fibrillary Glomerulonephritis. *Am J Nephrol.* 2017 Mar 1;45(3):248-56.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2017+Mar+1%3B45%283%29%3A248%E2%80%9356>

11 . Said SM, Leung N, Alexander MP, Cornell LD, Fidler ME, Grande JP, et al. DNAJB9-positive monotypic fibrillary glomerulonephritis is not associated with monoclonal gammopathy in the vast majority of patients. *Kidney Int.* 2020 Aug 1;98(2):498-504.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2020+Aug+1%3B98%282%29%3A498%E2%80%93504>

12 . Nasr SH, Fogo AB. New developments in the diagnosis of fibrillary glomerulonephritis. *Kidney Int.* 2019 Sep 1;96(3):581-92.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2019+Sep+1%3B96%283%29%3A581%E2%80%9392>

13 . Javaugue V, Karras A, Glowacki F, McGregor B, Lacombe C, Goujon JM, et al. Long-term Kidney Disease Outcomes in Fibrillary Glomerulonephritis: A Case Series of 27 Patients. *Am J Kidney Dis.* 2013 Oct 1;62(4):679-90.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2013+Oct+1%3B62%284%29%3A679%E2%80%9390>

14 . Dasari S, Alexander MP, Vrana JA, Theis JD, Mills JR, Negron V, et al. DnaJ heat shock protein family B member 9 is a novel biomarker for fibrillary GN. *Journal of the American Society of Nephrology.* 2018 Jan 1;29(1):51-6.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2018+Jan+1%3B29%281%29%3A51%E2%80%936>

15 . Andeen NK, Yang HY, Dai DF, MacCoss MJ, Smith KD. DnaJ homolog subfamily B member 9 is a putative autoantigen in fibrillary GN. *Journal of the American Society of Nephrology.* 2018 Jan 1;29(1):231-9.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2018+Jan+1%3B29%281%29%3A231%E2%80%939>

16 . Nasr SH, Vrana JA, Dasari S, Bridoux F, Fidler ME, Kaaki S, et al. DNAJB9 Is a Specific Immunohistochemical Marker for Fibrillary Glomerulonephritis. *Kidney Int Rep.* 2018;3(1):56-64.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2018%3B3%281%29%3A56%E2%80%9364>

17 . Nasr SH, Dasari S, Lieske JC, Benson LM, Vanderboom PM, Holtz-Heppelmann CJ, et al. Serum levels of DNAJB9 are elevated in fibrillary glomerulonephritis patients. *Kidney Int.* 2019 May 1;95(5):1269-72.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2019+May+1%3B95%285%29%3A1269%E2%80%9372>

18 . Andeen NK. Elevated serum concentrations of DNAJB9 in fibrillary glomerulonephritis: another step toward understanding a progressive disease. *Kidney Int.* 2019 May 1;95(5):1025-6.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2019+May+1%3B95%285%29%3A1025%E2%80%936>

19 . Erickson SB, Zand L, Nasr SH, Alexander MP, Leung N, Drosou ME, et al. Treatment of fibrillary glomerulonephritis with rituximab: a 12-month pilot study. *Nephrol Dial Transplant.* 2021 Jan 1;36(1):104-10.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2021+Jan+1%3B36%281%29%3A104%E2%80%9310>

20 . Leung N, Bridoux F, Batuman V, Chaidos A, Cockwell P, DiAgati VD, et al. The evaluation of monoclonal gammopathy of renal significance: a consensus report of the International Kidney and Monoclonal Gammopathy Research Group. *Nat Rev Nephrol.* 2019 Jan 1;15(1):45-59.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2019+Jan+1%3B15%281%29%3A45%E2%80%9359>

21 . Da Y, Goh GH, Lau T, Chng WJ, Soekojo CY. Fibrillary Glomerulonephritis and Monoclonal Gammopathy: Potential Diagnostic Challenges. *Front Oncol.* 2022 May 25;12:880923.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2022+May+25%3B12%3A880923>

22 . Kudose S, Canetta P, Andeen NK, Stokes MB, Batal I, Markowitz GS, et al. Diagnostic Approach to Glomerulonephritis With Fibrillar IgG Deposits and Light Chain Restriction. *Kidney Int Rep.* 2021 Apr 1;6(4):936-45.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2021+Apr+1%3B6%284%29%3A936%E2%80%9345>

23 . Leung N, Bridoux F, Nasr SH. Monoclonal Gammopathy of Renal Significance. *New England Journal of Medicine.* 2021 May 20;384(20):1931-41.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2021+May+20%3B384%2820%29%3A1931%E2%80%9341>

24 . Andeen NK, Kung VL, Robertson J, Gurley SB, Avasare RS, Sitaraman S. Fibrillary Glomerulonephritis, DNAJB9, and the Unfolded Protein Response. *Glomerular Dis.* 2022 Jun 16;2(4):164-75.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2022+Jun+16%3B2%284%29%3A164%E2%80%9375>

25 . Alexander MP, Dasari S, Vrana JA, Riopel J, Valeri AM, Markowitz GS, et al. Congophilic Fibrillary Glomerulonephritis: A Case Series. *Am J Kidney Dis.* 2018 Sep 1;72(3):325-36.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2018+Sep+1%3B72%283%29%3A325%E2%80%9336>

26 . Daverkosen-Fischer L, Pröls F. The function of the co-chaperone ERdj4 in diverse (patho-)physiological conditions. *Cellular and Molecular Life Sciences.* 2022 Jan 1;79(1).
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2022+Jan+1%3B79%281%29>

27 . Nasr S, Valeri AM, Cornell LD, Fidler ME, Sanjeev S, Leung N, et al. Fibrillary glomerulonephritis: A report of 66 cases from a single institution. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology.* 2011 Apr 1;6(4):775-84.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2011+Apr+1%3B6%284%29%3A775%E2%80%9384>

28 . Collins M, Navaneethan SD, Chung M, Sloand J, Goldman B, Appel G, et al. Rituximab treatment of fibrillary glomerulonephritis. *Am J Kidney Dis.* 2008 Dec;52(6):1158-62.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2008+Dec%3B52%286%29%3A1158%E2%80%9362>

29 . Javaugue V, Karras A, Glowacki F, McGregor B, Lacombe C, Goujon JM, et al. Long-term kidney disease outcomes in fibrillary glomerulonephritis: A case series of 27 patients. *Am J Kidney Dis.* 2013 Oct;62(4):679-90.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2013+Oct%3B62%284%29%3A679%E2%80%9390>

30 . Hogan J, Restivo M, Canetta PA, Herlitz LC, Radhakrishnan J, Appel GB, et al. Rituximab treatment for fibrillary glomerulonephritis. *Nephrol Dial Transplant.* 2014 Oct 1;29(10):1925-31.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2014+Oct+1%3B29%2810%29%3A1925%E2%80%9331>

31 . Andeen NK, Troxell ML, Riazy M, Avasare RS, Lapasia J, Jefferson JA, et al. Fibrillary glomerulonephritis clinicopathologic features and atypical cases from a multi-institutional cohort. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology.* 2019 Dec 6;14(12):1741-50.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2019+Dec+6%3B14%2812%29%3A1741%E2%80%9350>

32 . El Ters M, Bobart SA, Cornell LD, Leung N, Bentall A, Sethi S, et al. Recurrence of DNAJB9-Positive Fibrillary Glomerulonephritis After Kidney Transplantation: A Case Series. *Am J Kidney Dis.* 2020 Oct 1;76(4):500-10.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2020+Oct+1%3B76%284%29%3A500%E2%80%9310>

33 . Mallett A, Tang W, Hart G, McDonald SP, Hawley CM, Badve S V., et al. End-stage kidney disease due to fibrillary glomerulonephritis and immunotactoid glomerulopathy-Outcomes in 66 consecutive ANZDATA registry cases. *Am J Nephrol.* 2015 Nov 1;42(3):177-84.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2015+Nov+1%3B42%283%29%3A177%E2%80%9384>

34 . Nasr SH, Kudose SS, Said SM, Santoriello D, Fidler ME, Williamson SR, et al. Immunotactoid glomerulopathy is a rare entity with monoclonal and polyclonal variants. *Kidney Int.* 2021 Feb

1;99(2):410;20.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2021+Feb+1%3B99%282%29%3A410%E2%80%9320>

35 . Schwartz MM, Lewis EJ. The Quarterly Case: Nephrotic Syndrome in a Middle-aged Man. Ultrastruct Pathol. 1980 Jan 10;1(4):575;82.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=1980+Jan+10%3B1%284%29%3A575%E2%80%9382>

36 . Javaugue V, Dufour-Nourigat L, Desport E, Sibille A, Moulin B, Bataille P, et al. Results of a nationwide cohort study suggest favorable long-term outcomes of clone-targeted chemotherapy in immunotactoid glomerulopathy. Kidney Int. 2021 Feb 1;99(2):421;30.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2021+Feb+1%3B99%282%29%3A421%E2%80%9330>

37 . Nasr SH, Fidler ME, Cornell LD, Leung N, Cosio FG, Sheikh SS, et al. Immunotactoid glomerulopathy: clinicopathologic and proteomic study. Nephrol Dial Transplant. 2012 Nov 1;27(11):4137;46.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2012+Nov+1%3B27%2811%29%3A4137%E2%80%9346>

38 . Korbet SM, Schwartz MM, Lewis EJ. Immunotactoid glomerulopathy. Am J Kidney Dis. 1991 Mar;17(3):247;57.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=1991+Mar%3B17%283%29%3A247%E2%80%9357>

39 . Nasr SH, Fidler ME, Cornell LD, Leung N, Cosio FG, Sheikh SS, et al. Immunotactoid glomerulopathy: clinicopathologic and proteomic study. Nephrol Dial Transplant. 2012 Nov;27(11):4137;46.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2012+Nov%3B27%2811%29%3A4137%E2%80%9346>

40 . Fermand JP, Bridoux F, Kyle RA, Kastritis E, Weiss BM, Cook MA, et al. How I treat monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS). Blood. 2013;122(22):3583;90.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2013%3B122%2822%29%3A3583%E2%80%9390>

41 . Korbet SM, Rosenberg BF, Schwartz MM, Lewis EJ. Course of renal transplantation in immunotactoid glomerulopathy. Am J Med. 1990;89(1):91;5.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=1990%3B89%281%29%3A91%E2%80%935>