



## Principio Activo

Idecabtegene vicleucel

## Marca

**ABECMA** 260 - 500 × 10<sup>6</sup> células dispersión para perfusión (10-30 ml, 30-70 ml o 55-100 ml).

## Clase

Células CAR-T anti BCMA

## Indicación

MM refractario a tercera línea de tº que incluya inh proteosoma, inmunomodulador y anti CD38.

## Dosis

Dosis objetivo: 420 × 10<sup>6</sup> linfocitos T CAR positivos y un intervalo de 260 a 500 × 10<sup>6</sup>

Precisa pre TTº con CP 300 mg/m<sup>2</sup>/d/3d IV y fludarabina 30 mg/m<sup>2</sup>/d/3d IV

Pre ttº con paracetamol y difenhidramina (evitar Cs sistémicos)

## Dosis Renal

Los estudios realizados no incluyeron a pacientes con ERC. No hay datos al respecto.

## Nefrotoxicidad

- Si Sde. de liberación de citoquinas (SLC) (entre 1-12 días post): tocilizumab.

- Linfohistiocitosis hemofagocítica/síndrome de activación de macrófagos (LHH/SAM)

- Según ficha técnica: diarrea (36,4 %), hipopotasemia (34,2 %), hipofosfatemia (32,6 %), náuseas (32,6%), hipocalcemia (26,6 %), hipomagnesemia (22,3 %), edema periférico (20,1 %).

- Reacciones grado 3 o 4 (más frecuentes en las 8 1ª semanas post infusión): hipofosfatemia (17,4 %), hipocalcemia (7,1 %), SLC (5,4 %), HTA (5,4 %) e hiponatremia (5,4 %), hipofosfatemia (16,3 %).

## Plan