

Principio Activo

Glofitamab

Marca

COLUMVI Viales de 2,5 y 10 mg infusión IV

Clase

Ac monoconales. Otros.
Ac. monoclonales anti CD20/CD3

Indicación

Linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) en adultos con recaída o refractarios tras dos o más líneas de tratamiento

Dosis

Pauta escalonada de tratamiento:
CICLO 1:
*Día 1: pretratamiento con OBINUTUZUMAB 1000 mg en dosis única
*Día 8: 2,5 mg
*Día 15: 10 mg
Perfusión 4 horas
CICLO 2:
*Día 1: 30 mgr en 4 horas.
CICLOS 3 a 12:
*Día 1: 30 mg en 2 horas
Ciclos de 21 días. Máximo 12 ciclos.

Dosis Renal

CCr>30: sin cambios
CCr

Nefrotoxicidad

-Asociados a síndrome de liberación de citoquinas (SLC) (63% en ficha técnica).
-Asociados a SLT
- Hipofosforemia: de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: frecuente,
- Hipomagnesemia: de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: muy rara.
- Hipocalcemia: de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: muy rara.
- Hiponatremia: de cualquier grado frecuente, grados 3 y 4: frecuente.
Ni en ficha técnica ni en literatura médica se describen mecanismos.
- Diarrea: de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: muy rara,
- Vómitos: de cualquier grado frecuente, grados 3 y 4: muy rara.

Plan