

## Principio Activo

Glofitamab

## Marca

COLUMVI Viales de 2,5 y 10 mg infusión IV

## Clase

Ac monoconales. Otros.  
Ac. monoclonales anti CD20/CD3

## Indicación

Linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) en adultos con recaída o refractarios tras dos o más líneas de tratamiento

## Dosis

Pauta escalonada de tratamiento:  
CICLO 1:  
\*Día 1: pretratamiento con OBINUTUZUMAB 1000 mg en dosis única  
\*Día 8: 2,5 mg  
\*Día 15: 10 mg  
Perfusión 4 horas  
CICLO 2:  
\*Día 1: 30 mgr en 4 horas.  
CICLOS 3 a 12:  
\*Día 1: 30 mg en 2 horas  
Ciclos de 21 días. Máximo 12 ciclos.

## Dosis Renal

CCr>30: sin cambios  
CCr

## Nefrotoxicidad

-Asociados a síndrome de liberación de citoquinas (SLC) (63% en ficha técnica).  
-Asociados a SLT  
- Hipofosforemia: de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: frecuente,  
- Hipomagnesemia: de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: muy rara.  
- Hipocalcemia: de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: muy rara.  
- Hiponatremia: de cualquier grado frecuente, grados 3 y 4: frecuente.  
Ni en ficha técnica ni en literatura médica se describen mecanismos.  
- Diarrea: de cualquier grado muy frecuente, grados 3 y 4: muy rara,  
- Vómitos: de cualquier grado frecuente, grados 3 y 4: muy rara.

## Plan