

## Principio Activo

Melflufen (melfalan flufenamida)

## Marca

**PEPAXTI**  
Polvo para solución 20 mg

## Clase

Alquilantes. Inhibidores síntesis DNA

## Indicación

En combinación con dexametasona para adultos con mieloma múltiple resistente a tres líneas de tratamientos que incluyan un inhibidor del proteosoma, un inmunomodulador y un Ac monoclonal anti-CD38, y con progresión de la enfermedad.

## Dosis

**\*Si PESO 60 kg:** 40 mg  
Ambos el día 1 de cada ciclo de 28 días.  
**Asociar a dexametasona:** 40 mg IV de los días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo.  
(En > 75 años 20 mg).  
**Ante reacción adversa (1<sup>a</sup>-2<sup>a</sup>. 3<sup>a</sup>):** reducir dosis:  
**Inicial 40**- 30-20-15- Suspender si no tolera 15 mg  
**Inicial 30**-20-15. Suspender si no tolera 15 mg.

## Dosis Renal

->**FGe>45:** dosis plena  
->**FGe 30-45:** 30 mg  
->**FGe**

## Nefrotoxicidad

-Diarrea 19%  
-Hipopotasemia: frecuente.  
-Hipofosfatemia 5%  
-FRA (2%)  
- Melflufen (melfalan- flufenamida) es un MELFALAN inactivo que se activa dentro de las células del mieloma al escindir las aminopeptidasas el fármaco del péptido, lo que limita su toxicidad general y renal.

## Plan