



Principio Activo

Neratinib

Marca

NERLYNX Cmp 40 mg

Clase

Inhibidores de proteinquinasa
Inhibidores de la Tirosin quinasa del HER2
Inhibidores de la Tirosin quinasa del HER4
Inhibidores de la Tirosin quinasa del EGFR.

Indicación

Mama HER-2 positivo que hayan finalizado ttº adyuvante con trastuzumab hace al menos 1 año.

Dosis

240 mg/d/ durante 1 año.
Dosis matutina, administrado con alimentos (absorción lenta, máxima cocentración en 7 horas).
Se debe suspender ante efectos indeseables grado 4 ó cualquier otro que no regresen a grado 0-1, si se precisa suspender el ttº más de 3 semanas, si no tolera dosis de 120 mg/d.
Modificar dosis a 200-160-120 mg ante efectos indeseables 1º, 2º ó 3º.

Dosis Renal

-FGe; 30 mL/min: dosis plena
-FGe98%.
Metabolización por el CYP3A4.
Excreción fecal.

Nefrotoxicidad

-Diarrea 94,5%, 39,9% grado ≥3, que suele aparecer durante las 1ª (83,6%) ó 2ª semana y puede ser grave.
-Vómitos.
- Fallo renal agudo grave (1,2%) no se especifica causa ni en FT, IPT ni en revisiones de la literatura en PubMed a fecha 30/4/24 pero por el resto de efectos indeseables podría ser prerenal establecido.
-Edema periferico (21%).
-Hipopotasemia 11%.
-Infección tracto urinario 15%.

Plan