



Principio Activo

Pirtobrutinib

Marca

JAYPIRCA 50,100 mg cmp

Clase

Inhibidores de proteinquinasa
Inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton (BTK)

Indicación

Adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario tratados previamente con un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK).

Dosis

200 mg/24 horas
Con/sin alimentos
Interrumpir hasta la recuperación a grado 1 o basal si presenta:
Neutropenia grado 3 con fiebre y/o infección ó grado 4 > 7 días
Trombocitopenia grado 3 con hemorragia ó grado 4
Toxicidad no hematológica grado 3 o 4
La linfocitosis asintomática no se considera una reacción

Dosis Renal

ERC: no precisa ajuste de dosis.
HD: sin datos.

Nefrotoxicidad

ITUs frecuentes (6,9%), grado 3:0,7%
Hematuria frecuente (3,1%)
Diarrea muy frecuente (19,9%), grado 3:0,9%
Lesión renal aguda referida en IPT sin especificar mecanismo ni % puede inducir taquiarritmia SV e ICC). Elevación de Crp 30%.
SLT muy raramente.
HTA (9,5% recogido en IPT). Grado 3: 2,8%.

Plan