

## Principio Activo

Pirtobrutinib

## Marca

JAYPIRCA 50,100 mg cmp

## Clase

Inhibidores de proteinquinasa  
Inhibidores de la tirosin quinasa de Bruton (BTK)

## Indicación

Adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario tratados previamente con un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK).

## Dosis

200 mg/24 horas  
Con/sin alimentos  
Interrumpir hasta la recuperación a grado 1 o basal si presenta:  
Neutropenia grado 3 con fiebre y/o infección ó grado 4 ¿ 7 días  
Trombocitopenia grado 3 con hemorragia ó grado 4  
Toxicidad no hematológica grado 3 o 4  
La linfocitosis asintomática no se considera una reacción

## Dosis Renal

ERC: no precisa ajuste de dosis.  
HD: sin datos.

## Nefrotoxicidad

ITUs frecuentes (6,9%), grado ¿3:0,7%  
Hematuria frecuente (3,1%)  
Diarrea muy frecuente (19,9%), grado ¿3:0,9%  
Lesión renal aguda referida en IPT sin especificar mecanismo ni % puede inducir taquiarritmia SV e ICC). Elevación de Crp 30%.  
SLT muy raramente.  
HTA (9,5% recogido en IPT). Grado 3: 2,8%.

## Plan