



## Principio Activo

Ripretinib

## Marca

**QINLOCK** Cmp 50 mg

## Clase

Inhibidores de la protein quinasa. Inhibidores no selectivos de proteinquinasa.

## Indicación

Adultos con tumor avanzado del estroma gastrointestinal (GIST) tras ttº previo con tres o más inhibidores de quinasa, como imatinib.

## Dosis

150 mg/día siempre a la misma hora, sin/con alimentos. Si efectos indeseables, disminuir dosis a 100 mg/día (consultar ficha técnica para ajustes según grados).

## Dosis Renal

-<strong>FGe >30</strong> mL/min dosis plena</p><p class="MsoNormal">-<strong>FGe

## Nefrotoxicidad

-<strong>Diarrea</strong> (37,2%, <strong>vómitos</strong> 25,8%).</p><p class="MsoNormal">-<strong>HTA</strong> al inhibir el VEGFR2 (19,4%, grado 3-4: 6,9%), <strong>edemas</strong> periféricos (13,8%).</p><p class="MsoNormal">-<strong>Hipertensión, hipocalcemia, hipofosforemia</strong> grado 3-4 (4,1%).</p><p>-<strong>Lesión renal aguda</strong> (4,7% en estudio INVICTUS).</p>

## Plan