



Principio Activo

Elranatamab

Marca

ELREXFIO Jeringa precargada 40 mg/mL (1.1 mL: 44 mg y 1,9 mL:76 mg)

Clase

Ac. monoclonales anti BCMA/CD3 Ac monoclonales otros.

Indicación

MM en recaída y refractario al menos a tres tratamientos previos (inmunomodulador, inhibidor de proteosoma y Ac anti CD38) en progresión.

Dosis

-1ºd: 12 mg (SC) -4º d: 32 mg (SC) -2º-24ªs: 76 mg /semana (SC). -Si hay respuesta, a partir de la semana 24: 76 mg/2 semanas (SC).

Dosis Renal

-FGe >30: dosis plena -FGe

Nefrotoxicidad

-SLC: 64,2% (grave: 23%). -Hipopotasemia: 23% (grave: 8,7%) - Diarrea: 37,7% (grave:1,1%). - Hipofosfatemia: 6,6% (grave: 0,5%). - ITU: 12,6% (grave:4,4%) - Complicaciones no renales que pueden determinar secundariamente daño renal: Sde. neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunitarias. En búsqueda en Oct/2024 sin datos de nefrotoxicidad añadida en Pubmed. -En estudio de efectos indeseables de estimuladores de respuesta T, EPCORITAMAB y ELRANATAMB fueron los que se asociaron con más complicaciones renales y urinarias (PMID: 39982395).

Plan